


## Attenuazione dei dolori attraverso i medicinali

Lo scopo di una buona terapia del dolore è riuscire a fare in modo che il paziente non si senta più limitato a causa dei dolori. Per questo motivo i medicinali di base vengono adeguati alle Sue esigenze. Li assuma in base alla prescrizione.

I medicinali agiscono in modo ottimale se nel sangue permane sempre la stessa quantità del principio attivo. Pertanto l'assunzione dei medicinali dovrebbe avvenire nell'arco delle 24 ore.

Beispiel einer Medikamenteneinnahme «rund um die Uhr»:





Se prova forti dolori nonostante l'assunzione regolare dei medicinali di base:

- assumi a titolo supplementare anche i medicinali di riserva prescritti assieme ai medicinali di base;
- non attenda oltre, neanche per paura che in seguito non potrà più disporre di terapie adeguate;
- se deve assumere i medicinali di riserva più di 3 volte al giorno nell'arco di 3 giorni successivi, ciò significa che sarebbe opportuno un adeguamento dei medicinali di base. Contatti la Sua équipe curante.

Esistono diversi gruppi di medicinali antidolorifici.

Uno di essi è quello degli «oppiacei»; questi funzionano in modo analogo all'endorfina, una sostanza presente nel nostro corpo e che ha un effetto antidolorifico.

Se dovesse avere dubbi o domande riguardo agli antidolorifici, contatti la Sua équipe curante.