

Suggerimenti

Consulenza dietetica

Un dietista può offrirle informazioni supplementari e una consulenza individuale. Chieda consiglio alla Sua équipe curante.

Protezione contro l'incontinenza

Gli inserti protettivi contro l'incontinenza possono essere acquistati presso diversi fornitori, nonché nelle farmacie, drogherie o presso le grandi aziende di distribuzione. Se preferisce, però, potrà anche ordinare a domicilio i prodotti di cui necessita. Alcune aziende sono specializzate in questo e si possono trovare digitando in Internet i termini di ricerca: «prodotti contro l'incontinenza in Svizzera». La Sua équipe curante potrà offrirle consulenza a tale proposito.

Weitere Informationen zu diesem Thema

- «Terapie medicamentose dei tumori», Krebsliga Schweiz
- «Alimentazione e cancro», Krebsliga Schweiz

Questo opuscolo è stato scritto in collaborazione con pazienti ed esperti.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web.



Diarrea

Buono a sapersi

Determinati tipi di chemioterapie e la radioterapia nella regione addominale possono provocare diarrea. Spesso il motivo è correlato all'infiammazione delle mucose intestinali.

La diarrea si manifesta attraverso defecazioni frequenti (in genere più di tre volte al giorno), liquide fino ad acquose. Talvolta la diarrea è accompagnata anche da dolori o crampi addominali e si ha l'impressione che la quantità di feci sia maggiore del solito. Una diarrea che si protrae per un periodo prolungato, se non trattata, può provocare problemi seri di salute.

Tuttavia, spesso la diarrea può essere controllata con mezzi semplici e sono disponibili medicinali per curarla.

Diarrea

Si sente...	Oppure osserva (che)...	Quello che può fare per Sé...
	<ul style="list-style-type: none">Defecazione fino a tre volte al giorno	<ul style="list-style-type: none">Mangi e beva quello che le piace! Tenga però presente che i cibi piccanti o grassi possono favorire la diarrea.Mangi più alimenti astringenti come il riso, le carote cotte oppure il cioccolato fondente.
	<ul style="list-style-type: none">Defecazione superiore alle tre volte al giorno con feci liquide fino ad acquoseCrampi addominali	<ul style="list-style-type: none">Contatti la Sua équipe curante se ha ricevuto un trattamento con immunoterapie.Assuma i medicinali contro la diarrea che le sono stati prescritti.Assuma almeno due litri di liquidi al giorno: acqua, tè, bevande senza dolcificanti artificiali, brodi e zuppe.Borse dell'acqua calda o cuscini termici sull'addome possono alleviare i dolori addominali, tuttavia ricorra a tale rimedio solamente nel caso di crampi addominali che già conosce.Per prevenire che la pelle subisca lesioni, eviti possibilmente di strofinare con troppa forza con la carta igienica la pelle attorno all'ano. Deterga la pelle delicatamente con acqua (per es. con salviette monouso umide) e tamponi leggermente la pelle per asciugarla. Sulla pelle secca, in un secondo momento, può applicare una crema idratante per lesioni.Se non riesce a controllare del tutto l'evacuazione, utilizzi un opportuno inserto protettivo contro l'incontinenza.
	<ul style="list-style-type: none">Oltre 6 evacuazioni al giorno nonostante l'assunzione di medicinaliFebbre a partire da 38 °C, brividiDiarrea che si manifesta assieme al vomitoVertigini e debolezzaLa consueta quantità di liquidi assunta si riduceLa consueta quantità di urina si riduce drasticamenteComparsa di nuovi crampi addominali	<ul style="list-style-type: none">Si metta in contatto con la Sua équipe curante.